


Mathematisches Seminar

Spezielle Funktionen

3. Verallgemeinerte Potenzreihen



1. Die Besselsche Differentialgleichung

Die Besselsche Differentialgleichung auf \mathbb{R}^+ ist die homogene DGL 2. Ordnung.

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

Achtung: für $x=0$ wird dies zu $-\nu^2 y = 0$, d.h. wenn $\nu \neq 0$ ist, muss $y(0) = 0$ sein.

Massenheiten: $[x]$ = Masseinheit von x , $[y]$...

$$[y'] = \frac{[y]}{[x]}, \quad [y''] = \frac{[y]}{[x]^2}$$

$$[x]^2 \frac{[y]}{[x]^2} + [x] \frac{[y]}{[x]} + [x]^2 [y] + [\nu^2] [y]$$

" " **Problem** " "

[y] [y] [y] [y]

→ Bessel DGL muss "dimensionlos" sein!

Schwierigkeit: man kann an der Stelle $x=0$ nicht nach y'' auflösen:

$$y'' = -\frac{y'}{x} - \left(1 - \frac{\nu^2}{x^2}\right)y$$

Die DGL legt an der Stelle $x=0$ den weiteren Kurvenverlauf nicht fest!

Man sagt: die DGL hat eine Singularität bei $x=0$.

2. Potenzreihenmethode funktioniert nicht

Die Besselsche DGI ist ein Spezialfall der allgemeineren DGI

$$x^2 y'' + p(x) x y' + q(x) y = 0 \quad (*)$$

Bessel-DGI ist der Fall

$$\left. \begin{array}{l} p(x) = -1 \\ q(x) = x^2 - \nu^2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{sehr einfache} \\ \text{Potenzreihen} \end{array}$$

=> Annahme: $p(x), q(x)$ haben konvergente Potenzreihenentwicklungen:

$$p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k x^k = p_0 + p_1 x + p_2 x^2 + \dots$$

$$q(x) = \sum_{k=0}^{\infty} q_k x^k = q_0 + q_1 x + q_2 x^2 + \dots$$

Lösungsansatz mit Potenzreihe:

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

Ableitungen:

$$y'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$$

$$x y'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^k$$

Analog für die 2. Ableitung

$$x^2 y''(x) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) a_k x^k$$

Betrachte den Spezialfall $p(x) = p_0 = \text{const}$ und $q(x) = q_0 = \text{const}$. Dann wird die Differentialgleichung

$$0 = x^2 y'' + p(x) x y' + q(x) y$$

$$= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) a_k x^k + \sum_{k=1}^{\infty} p_0 k a_k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} q_0 a_k x^k$$

$$= \begin{array}{l} + \quad q_0 a_0 \\ + \quad p_0 a_1 x + q_0 a_1 x \\ + \sum_{k=2}^{\infty} (k(k-1) + p_0 k + q_0) a_k x^k \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} k=0 \\ k=1 \\ k \geq 2 \end{array} \right.$$

Koeffizientenvergleich:

$$q_0 a_0 = 0 \quad \implies \quad a_0 = 0$$

$$(p_0 + q_0) a_1 = 0 \quad \implies \quad a_1 = 0$$

$$(k^2 + (p_0 - 1)k + q_0) a_k = 0 \quad \implies \quad a_k = 0 \quad k \geq 2$$

Ausnahmen: $q_0 = 0$, $p_0 + q_0 = 0$, k eine Nullstelle von $k^2 + (p_0 - 1)k + q_0$

Folgerung: für allgemeine Koeffizienten liefert die Potenzreihenmethode nur die Lösung $y(x) = 0$!

Für die Differentialgleichung (*) funktioniert die Potenzreihenmethode im allgemeinen nicht!

Ursache: Potenzreihe kann eine mögliche Singularität der Lösung bei $x=0$ nicht wiedergeben \rightarrow verallgemeinerter Ansatz nötig

Die Rechnung auf der vorangegangenen Seite hätte auch so funktioniert:

$$x^2 y'' + p_0 x y' + q_0 y = \sum_{k=0}^{\infty} (k(k-1) + p_0 k + q_0) x^k = 0$$

$$\Rightarrow k^2 + (p_0 - 1)k + q_0 = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \text{nur wenn } \frac{p_0 - 1}{2} \pm \sqrt{\frac{(p_0 - 1)^2}{4} - q_0} \in \mathbb{N}$$

kann die Potenzreihenmethode eine Lösung $\neq 0$ liefern. Die **quadratische Gleichung** hat also eine zentrale Bedeutung.

3. Verallgemeinertes Potenzreihe

Idee: x^g mit $g \notin \mathbb{N}$ könnte eine Singularität wiedergeben

Verallgemeinerter Potenzreihenansatz:

$$y(x) = x^g \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+g}$$

mit $a_0 \neq 0$.

Wäre $a_0 = 0$ und k_0 der kleinste Index derart, dass $a_k \neq 0$ ist, könnte man g durch $g' = g + k_0$ ersetzen und a_k durch $a_k' = a_{k-k_0}$, dann ist

$$\begin{aligned} y(x) &= x^g \sum_{k=k_0}^{\infty} a_k x^k = x^g \sum_{k'=0}^{\infty} a_{k'+k_0} x^{k'+k_0} \\ &= x^{g+k_0} \sum_{k'=0}^{\infty} a_{k'}' x^{k'} \quad \text{mit } a_0' = a_{k_0} \neq 0 \end{aligned}$$

Neues Problem: Wie muss g gewählt werden?

4. Die Indexgleichung

Differentialgleichung: $x^2 y'' + p(x)xy' + q(x)y = 0$

Ansatz: $y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+s}$

$$xy'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+s) a_k x^{k+s}$$

$$x^2 y''(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+s)(k+s-1) a_k x^{k+s}$$

Einsetzen:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+s)(k+s-1) a_k x^{k+s}$$

$$+ \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{l=0}^{\infty} (k+s) a_k p_l x^{l+k+s}$$

$$k = l+k$$

$$k = k-l$$

$$+ \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{l=0}^{\infty} a_k q_l x^{l+k+s}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} (k+s)(k+s-1) a_k x^{k+s}$$

$$+ \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{l=0}^k (k-l+s) a_{k-l} p_l x^{k+s}$$

$$+ \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{l=0}^k a_{k-l} q_l x^{k+s}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} x^{k+s} \left((k+s)(k+s-1) a_0 + \sum_{l=0}^k (k+s) a_l p_{k-l} + \sum_{l=0}^k a_l q_{k-l} \right)$$

Koeffizientenvergleich: für alle k gilt

$$(k+p)(k+p-1)a_k + \sum_{e=0}^k a_e((k+p)p_{k-e} + q_{k-e}) = 0$$

Fall $k=0$:

$$(p(p-1) + \underbrace{pp_0 + q_0}_{\neq 0 \text{ nach Ansatz}}) a_0 = 0$$

$\Rightarrow p$ muss Nullstelle sein der Indexgl:

Definition: Die **Indexgleichung** der DGI (*)

ist

$$p(p-1) + pp_0 + q_0 = 0$$
$$F(p) = p^2 + (p_0-1)p + q_0 = 0$$

Nullstellen der Indexgleichung:

$$p_{\pm} = \frac{p_0-1}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p_0-1}{2}\right)^2 - q_0}$$

Bestimmung der Koeffizienten

Fall $k=1$:

$$(p+1)pa_0 + a_0((1+p)p_1 + q_1) + a_1((1+p)p_0 + q_0) = 0$$

auflösen nach a_1

$$a_1 = - \frac{p(p+1) + (1+p)p_1 + q_1}{(1+p)p_0 + q_0} a_0$$

Allgemeiner Fall:

$$\begin{aligned} & ((k+\varrho)(k+\varrho-1) + (k+\varrho)p_0 + q_0)a_k \\ & + \sum_{e=0}^{k-1} a_e ((k+\varrho)p_{k-e} + q_{k-e}) = 0 \end{aligned}$$

auflösen nach $a_k \rightarrow$ Rekursionsformel

$$a_k = - \frac{\sum_{e=0}^{k-1} a_e ((k+\varrho)p_{k-e} + q_{k-e})}{(k+\varrho)(k+\varrho-1) + (k+\varrho)p_0 + q_0}$$

Nenner:

$$\begin{aligned} & (k+\varrho)(k+\varrho+p_0-1) + q_0 \\ & = (k+\varrho)^2 + (p_0+1)(k+\varrho) + q_0 = F(\varrho+k) \end{aligned}$$

d.h. der Nenner ist der Wert des Index-Polynoms an der Stelle $\varrho+k$. Wenn $\varrho_+ - \varrho_- \notin \mathbb{Z}$, dann ist der Nenner immer $\neq 0$ und die verallgemeinerte Potenzreihe kann konstruiert werden.

Problem: wenn $\varrho_+ - \varrho_- \in \mathbb{Z}$ kann man mit dieser Technik nur eine Lösung finden, eine DGL 2. Ordnung hat aber 2 lin. unabh. Lösungen!

5. Bessel-Funktionen

Die Besselsche Differentialgleichung ist der Fall $p(x)=1$, $q(x)=x^2-v^2$, die Indexgleichung wird daher

$$(\cancel{\rho-1}) + \underbrace{p_0}_{=1} \rho + \underbrace{q_0}_{-v^2} = \rho^2 - v^2 = (\rho+v)(\rho-v)$$

mit Nullstellen $\pm v$.

\Rightarrow Die verallgemeinerte Potenzreihenmethode kann Lösungen für beliebige $v \in \mathbb{R}$ liefern!

$v < 1$ führt auf Lösungen, die bei $x=0$ nicht differenzierbar sind.

Bestimmung der Koeffizienten der verallg. Potenzreihe mit der Rekursionsformel für a_n mit $p_0=1$, $q_0=-v^2$, $q_2=1$, alle anderen Koeffizienten $=0$.

Anfangswerte:

$$a_0 = 1$$

$$a_1 = - \frac{a_0 \left((1+\rho) \overset{=0}{p_1} + \overset{=0}{q_1} \right)}{\rho(\rho+1) + (\rho+1)p_0 + q_0} = - \frac{0}{(\rho+1)^2 - v^2}$$
$$= - \frac{0}{v^2 \pm 2v + 1 - v^2} = - \frac{0}{\pm 2v + 1} = 0$$

außer evtl. für $v = \pm \frac{1}{2}$

Der allgemeine Fall: **Rekursionsformel** für a_k

$$a_k = - \frac{a_{k-2} q_2}{(k+q)(k+q-1) + (k+q)p_0 + q_0}$$

$$= - \frac{1}{(k+q)^2 - \nu^2} a_{k-2}$$

Unter Verwendung von $q = \pm \nu$

$$a_k = \frac{-a_{k-2}}{(k \pm \nu)^2 - \nu^2} = \frac{-1}{k^2 \pm 2k\nu} a_{k-2}$$

$$a_k = - \frac{1}{k(k \pm 2\nu)} a_{k-2}$$

Damit kann man jetzt die Potenzreihe der **Lösung** hinschreiben:

$$y(x) = x^\nu \left(1 - \frac{1}{2(2+2\nu)} x^2 + \frac{1}{2(2+2\nu)4(4+2\nu)} x^4 - \frac{1}{2(2+2\nu)4(4+2\nu)6(6+2\nu)} x^6 + \dots \right)$$

$$= x^\nu \left(1 + \frac{1}{1 \cdot (1+\nu)} \left(-\frac{x^2}{4} \right) + \frac{1}{1 \cdot 2 (1+\nu)(2+\nu)} \left(-\frac{x^2}{4} \right)^2 + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 (1+\nu)(2+\nu)(3+\nu)} \left(-\frac{x^2}{4} \right)^3 + \dots \right)$$

$$= x^\nu \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k! (\nu+1)_k} \left(-\frac{x^2}{4} \right)^k$$

$$y_{\pm \nu}(x) = x^{\pm \nu} {}_0F_1 \left(; \pm \nu + 1 ; -\frac{x^2}{4} \right)$$

hypergeom.
Funktion!

Pochhammer-Symbol durch Gamma-Funktion ersetzen:

$$(v+1)_k = (v+1)(v+2) \cdots (v+k)$$

$$\Gamma(v+k+1) = (v+k)(v+k-1) \cdots (v+1)\Gamma(v+1)$$

$$\Rightarrow (v+1)_k = \Gamma(v+k+1) / \Gamma(v+1)$$

Pochhammer-Symbol $(v+1)_k$ und $\Gamma(v+k+1)$ unterscheiden sich um einen Faktor, der von k unabhängig ist.

Definition: Bessel-Funktion erste Art der Ordnung ν :

$$J_\nu(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^\nu \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(\nu+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

Weitere Eigenschaften der Bessel-Funktionen:

① $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$

② Erzeugende Funktion

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} J_n(x) z^n = \exp\left(\frac{x}{2} \left(z - \frac{1}{z}\right)\right)$$

③ Additionstheorem:

$$J_\nu(x+y) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(x) J_{\nu-m}(y)$$